

ESTRATTO DALLA CARTA DEI SERVIZI Cap 2.6

BREATH-TEST per HELICOBACTER PYLORI

A COSA SERVE:

Il test è indicato per valutare la presenza di Helicobacter Pylori (HP) nella mucosa gastrica

AVVERTENZE:

Per garantire una adeguata accuratezza del test è indispensabile seguire le istruzioni sotto elencate:

- ✓ Si raccomanda la sospensione degli antiacidi almeno 15 giorni prima l'esecuzione del test, poiché questi interferiscono con la crescita batterica e potrebbero determinare dei risultati falsi negativi.

Esempi di antiacidi (anti-H2) aventi come principio attivo:

- Cimetidina (Biomag, Brumetidina, Citimid, Dina, Eureceptor, Stomet, Tagamet, Temic, Ulcedin, Ulcodina, Ulcomedina, Ulis)
- Cloridrato di Cimetidina (Notul, Ulcestop)
- Ranitidina (Raniben, Ranibloc, Ranidil, Ranidiz, Ulcex, Zantac)
- Nizatidina (Cronizat, Nizax, Zanizal)
- Famotidina (Famodil, Gastridin)
- Pirenzepina (Leblon)


- ✓ Si raccomanda la sospensione di inibitori della pompa protonica (PPI) almeno 15 giorni prima l'esecuzione del test, poiché questi interferiscono con la crescita batterica e potrebbero determinare dei risultati falsi negativi.

Esempi di PPI aventi come principio attivo:

- Omeprazolo (Antra, Mepral, Losec, Logastric, Omeprazem)
- Lansoprazolo (Dakar, Prevacid, Lansox, Limpidex, Zoton)
- Esomeprazolo (Inexium, Nexium, Axagon, Lucen)
- Pantoprazolo (Pantoloc, Inipomp, Pantopan, Pantorc, Peptazol, Pantecta)
- Rabeprazolo sodico (Pariet)
- Esomeprazolo (Lucen)

Data emissione: 10/01/2018

APPROVAZIONE Dir Lab _____



Laboratorio clinico Dibattista Srl
(LCDsrl)

Piazza Cavour n°27 – 70024 GRAVINA (BA)
C-F. P.IVA 070196607224

- ✓ Sempre previo assenso del medico curante e/o dello specialista vanno sospesi per 2-3 giorni farmaci gastroprotettori quali: Maalox, Gadril, Riopan, Gaviscon, Motilium, Peridon, ecc.
- ✓ Nelle ultime 4 settimane non devono essere stati assunti antibiotici;
- ✓ Il test non deve essere fatto in pazienti con diagnosi di Gastrite atrofica, con accertata o sospetta infezione gastrica sostenuta da agenti patogeni diversi da *Helicobacter pylori* o in presenza di emorragie gastroduodenali

- ✓ Prima della sua esecuzione il paziente deve essere stato a digiuno per almeno 6 ore (sono sufficienti 3 ore per i bambini) o per tutta la notte. Il test è valido anche se il paziente ha mangiato; si consiglia il digiuno per una minore variabilità dei risultati;
- ✓ L'efficacia della terapia di eradicazione con la ripetizione del test, va valutata almeno due mesi dopo il termine del trattamento, altrimenti si potrebbero avere falsi negativi
- ✓ Per tutta la durata del test (circa 30 minuti) non si devono assumere cibi o bevande né fumare
- ✓ Durante l'effettuazione del test il paziente dovrà rimanere a riposo

Data emissione: 10/01/2018

APPROVAZIONE Dir Lab _____